

# Früherkennungsschema zur Bewertung des Gesundheitszustandes von neu geborenen Fohlen

## 1. Lebensstunde

1. Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt (1 – 2 Minuten)
- Kopf-Brustlage + regelmäßige Atmung (Mundspalt geschlossen) 3
  - Seitenlage + regelmäßige Atmung 2
  - Seitenlage + gestörte Atmung (Mundatmung, unregelmäßige Frequenz) 1

2. Lage und Situation bis zu 30 Minuten nach der Geburt
- Erste Aufstehversuche 3
  - Verharren in Brust- oder Seitenlage 2
  - Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle 1

3. Lage und Situation bis zu 60 Minuten nach der Geburt
- Sichereres Stehen und erster Euterkontakt 3
  - Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch angehoben 2
  - Weiteres Verharren in Liegeposition (Seitenlage, aufgestützter Kopf) 1
- Gesamt:

Punktzahl: 9 – 8 Punkte      vitales Fohlen  
 7 – 6 Punkte      gefährdetes Fohlen  
 < 6 Punkte      hochgradig gefährdetes Fohlen

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Bad Liebenwerda

Dr. G. Kreher / Dr. E. Stammitz / Dr. M. Kreher

Schillerstr. 6

04924 Bad Liebenwerda

Tel.: 035341-2730

[www.tierarzt-ee.de](http://www.tierarzt-ee.de)

Ansprechpartner: Dr. E. Stammitz 0172-2446163

Dr. M. Kreher 0172-6464001



## 2.-24. Lebensstunde

1. Stehvermögen
- Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung 3
  - Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung 2
  - Häufiges Liegen schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegung 1

2. Körpertemperatur
- 38,2 – 39,0 °C 3
  - > 39,2 °C 1
  - < 38,0 °C 1

3. Mekoniumabgang
- Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot 3
  - Geringe Menge, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe 2
  - Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen und Wälzen 1

4. Harnabsatz
- Normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge 3
  - Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen 2
  - Kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition (weibl./männl.) 1

5. Atmung
- Regelmäßig und gleichmäßig 3
  - Unregelmäßig 2
  - Stößweise – flach, gebähnte Nüstern 1

6. Kontakt mit Muttertier
- Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Säug- getäuschen 3
  - Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt 2
  - Umherrennen ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters 1

Punktzahl: 18      normale Entwicklung  
 17 – 15      gefährdet, Tierärztliche Kontrolle notwendig  
 < 15      hochgradig gefährdet, sofortige Konsultation eines Tierarztes notwendig

Gesamt:

Bostedt H, Hospes R, Herfen K (1997)